

Załącznik nr 2 do decyzji MRiRW nr R - 296/2015d z dnia 29.04.2015 r.
zmieniającej zezwolenie MRiRW nr R - 66/2012 z dnia 10.04.2012 r.

Posiadacz zezwolenia:

Syngenta Polska Sp. z o.o., ul. Szamocka 8, 01 - 797 Warszawa, Rzeczpospolita Polska, tel.: (22) 326-06-01, fax: (22) 326 - 06 - 99.

Podmioty odpowiedzialne za końcowe etykietowanie i pakowanie:

1. Agrecol Sp. z o. o., Mesznary 2, 98 - 400 Wieruszów, tel.: (62) 78 32 000.
2. Agropak Sp. J., Brzeziński i Wspólnicy, ul. Darwina 1d, 43 - 603 Jaworzno, tel.: (32) 61 56 330.
3. Sumin Sp. J., D. Czabańska, W. Czabański i Wspólnicy, ul. Jagodowa 4, 62 - 002 Suchy Las, tel.: (61) 29 72 600.
4. Target S.A., ul. Przemysłowa 5, Kartoszyno, 84 - 110 Krokowa, tel.: (58) 676 74 89.

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE 67,8 WG

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników nieprofesjonalnych

Zawartość substancji czynnych:

Metalaksyl - M (związek z grupy fenyloamidów) – 3,8% (38,8 g/kg),
mankozeb (związek z grupy ditiokarbaminianów) – 64% (640 g/kg).

Zezwolenie MRiRW nr R – 66/2012 z dnia 10.04.2012 r.,
zmienione decyzją MRiRW nr R – 238/2012d z dnia 03.10.2012 r.,
decyzją MRiRW nr R – 87/2013d z dnia 18.04.2013 r.
oraz decyzją MRiRW nr R - 296 /2015d z dnia 29.04.2015 r.



Uwaga

H 317 – Może powodować reakcję alergiczną skóry.

H 361d – Podejrzewa się, że działa szkodliwie na dziecko w łonie matki.

H 410 – Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

EUH 401 - W celu uniknięcia zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska, należy postępować zgodnie z instrukcją użycia.

P 201 – Przed użyciem zapoznać się ze specjalnymi środkami ostrożności.

P 280 – Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.

P 302+P 352 – W przypadku dostania się na skórę umyć dużą ilością wody z mydłem.

P 308 + P 313 – W przypadku narażenia lub stycznosci: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.

Zebrać wyciek.

OPIS DZIAŁANIA

RIDOMIL GOLD MZ PEPITE 67,8 WG jest środkiem grzybobójczym w formie granul do sporządzania zawiesiny wodnej o działaniu układowym i kontaktowym, do stosowania zapobiegawczego w okresie intensywnego wzrostu roślin, przeznaczony do ochrony przed chorobami grzybowymi ziemniaka, winorośli, tytoniu, uprawianych w gruncie: pomidora, cebuli, brokuła, kalafiora, sałaty, roślin ozdobnych, uprawianych pod osłonami: ogórka, roślin ozdobnych.

Środek przeznaczony do stosowania przy użyciu opryskiwaczy ręcznych.

STOSOWANIE ŚRODKA

1. Ziemniak

alternarioza

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 g na 100 m².

Zalecana ilość wody: **2 – 4 litry na 100 m².**

Ilość wody dostosować do wielkości roślin.

Zalecane opryskiwanie: **drobnokropliste.**

Zapobiegawczy zabieg przeciwko alternariozie zaleca się wykonać tylko na plantacjach odmian wrażliwych na alternariozę, w momencie pojawienia się pierwszych objawów choroby na dolnych liściach, od fazy rozwiniętego 5 liścia na pędzie głównym do końca fazy dojrzewania (BBCH 15 - 90).

Zaraza ziemniaka

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g na 100 m².

Zalecana ilość wody: **2 – 4 litry na 100 m².**

Większą ilość wody stosować w przypadku silnie rozwiniętej naci ziemniaczanej.

Zalecane opryskiwanie: **drobnokropliste.**

Opryskiwanie wykonać zgodnie z sygnalizacją lub na odmianach wczesnych w okresie zwierania się roślin w rzędach, a na odmianach późnych po wystąpieniu pierwszych objawów zarazy na odmianach wczesnych, od fazy rozwiniętego 5 liścia na pędzie głównym do końca fazy dojrzewania (BBCH 15 - 90).

W wyjątkowych przypadkach silnego zagrożenia zarazą ziemniaka, zabieg środkiem Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG można powtórzyć po 10 dniach od pierwszego opryskiwania.

Odstęp między zabiegami: co **10 – 14 dni.**

Maksymalna liczba zabiegów w sezonie wegetacyjnym: 2.

Uwaga:

Dalsze zabiegi wykonywać używając środków kontaktowych po 7 - 10 dniach od ostatniego stosowania środka Ridomil Gold MZ Pepite 67,8 WG, pamiętając o przemiennym ich stosowaniu.

2. Pomidor uprawiany w gruncie

zaraza ziemniaka, alternarioza

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 22,5 g na 100 m².

Maksymalna liczba zabiegów: **3.**

Odstęp pomiędzy zabiegami: **7 – 10 dni.**

Zalecana ilość wody: **6 – 8 litrów na 100 m².**

Ilość wody dostosować do wielkości roślin.

Zalecane opryskiwanie: **drobnokropliste.**

Zabiegi wykonywać zgodnie z sygnalizacją, od fazy rozwiniętego 5 liścia właściwego na pędzie głównym do fazy pełnej dojrzałości owoców (BBCH 15 - 89). Środek stosować przemiennie z fungicydami należącymi do innych grup chemicznych.

3. Cebula uprawiana w gruncie

mączniak rzekomy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 g na 100 m².

Maksymalna liczba zabiegów: **3.**

Odstęp pomiędzy zabiegami: **7 – 10 dni.**

Zalecana ilość wody: **7 litrów na 100 m².**

Zalecane opryskiwanie: **drobnokropliste.**

Zabiegi wykonać zgodnie z sygnalizacją, od fazy wyraźnie widocznego drugiego liścia na pędzie głównym do końca fazy rozwoju części roślin przeznaczonych do zbioru (BBCH 12 - 49).

Środek stosować przemiennie z fungycydami należącymi do innych grup chemicznych.

STOSOWANIE ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN W UPRAWACH I ZASTOSOWANIACH MAŁOBSZAROWYCH

*Odpowiedzialność za skuteczność działania i fitotoksyczność
środka ochrony roślin stosowanego w uprawach małoobszarowych
ponosi wyłącznie jego użytkownik*

1. Ogórek uprawiany pod osłonami

mączniak rzekomy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 g na 100 m².

Maksymalna liczba zabiegów: **3.**

Odstęp pomiędzy zabiegami: **7 -10 dni.**

Zalecana ilość wody: **6 – 8 litrów na 100 m².**

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Zabiegi wykonać z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy 5 liścia do końca fazy dojrzewania owoców.

2. Brokuł uprawiany w gruncie

bielik krzyżowych /rdza biała krzyżowych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g na 100 m².

Maksymalna liczba zabiegów: **3.**

Odstęp pomiędzy zabiegami: **14 - 21 dni.**

Zalecana ilość wody: **7 litrów na 100 m².**

Zalecane opryskiwanie: **drobnokropliste.**

Zabiegi wykonać z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy 3 liścia do końca fazy ciasno zamkniętej główki o typowej wielkości i kształcie.

3. Kalafior uprawiany w gruncie

bielik krzyżowych /rdza biała krzyżowych

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 20 g na 100 m².

Maksymalna liczba zabiegów: **3.**

Odstęp pomiędzy zabiegami: **14 - 21 dni.**

Zalecana ilość wody: **7 litrów na 100 m².**

Zalecane opryskiwanie: drobnokropliste.

Zabiegi wykonać z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy 3 liścia do końca fazy ciasno zamkniętej główki o typowej wielkości i kształcie.

4. Sałata uprawiana w gruncie

mączniak rzekomy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 19 g na 100 m².

Maksymalna liczba zabiegów: **2.**

Odstęp pomiędzy zabiegami: **7 – 14 dni.**

Zalecana ilość wody: **3 – 8 litrów na 100 m².**

Zalecane opryskiwanie: **drobnokropliste.**

Zabiegi wykonać zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy 3 liścia do końca fazy osiągnięcia typowej masy liści.

5. Winorośl

mączniak rzekomy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 7,5 g na 100 m².

Maksymalna liczba zabiegów: **3.**

Odstęp pomiędzy zabiegami: **10 – 14 dni.**

Zalecana ilość wody: **7 litrów na 100 m².**

Zalecane opryskiwanie: **drobnokropliste.**

Zabiegi wykonać zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od fazy wyraźnie widocznych kwiatostanów do końca fazy kwitnienia.

6. Tytoń

mączniak rzekomy

Maksymalna/zalecana dawka dla jednorazowego zastosowania: 25 g na 100 m².

Maksymalna liczba zabiegów: **2.**

Odstęp pomiędzy zabiegami: **10 dni.**

Zalecana ilość wody: **4 - 5 litrów na 100 m².**

Zalecane opryskiwanie: **drobnokropliste.**

Zabiegi wykonać zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, nie wcześniej niż po wysadzeniu rozsady (tj. od fazy 5 – 6 liści). Drugi zabieg wykonać po ok. 10 dniach (faza 9 - 12 liści).

7. Rośliny ozdobne uprawiane w gruncie i pod osłonami

mączniak rzekomy, fytoftoroz (liści i łodyg)

Maksymalne/zalecane stężenie dla jednorazowego zastosowania: 0,25% (25 g środka w 10 l wody).

Zalecana ilość cieczy użytkowej: **10 l/100 m².**

Maksymalna liczba zabiegów: **2.**

Odstęp pomiędzy zabiegami: **7 dni.**

Zabiegi wykonać zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów choroby, od czerwca do września.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I ZALECENIA STOSOWANIA ZWIĄZANE Z DOBRĄ PRAKTYKĄ ROLNICZĄ

- Środek stosować przemiennie z fungycydami należącymi do innych grup chemicznych.**
- Warunkiem skuteczności zabiegu jest dokładne pokrycie roślin cieczą użytkową.
- Nie stosować środka w czasie opadu deszczu lub przed spodziewanym deszczem.
- Podczas stosowania środka **nie dopuścić do:**
 - znoszenia cieczy użytkowej na sąsiednie rośliny uprawne,
 - nakładania się cieczy użytkowej na stykach pasów zabiegowych i uwrociach.

SPORZĄDZANIE CIECZY UŻYTKOWEJ

Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Odważoną ilość środka wsypać do zbiornika opryskiwacza napełnionego częściowo wodą. Opróżnione opakowania przepłukać trzykrotnie wodą, a popłuczyny wlać do zbiornika opryskiwacza z cieczą użytkową, uzupełnić wodą do potrzebnej ilości i dokładnie wymieszać. W przypadku przerw w opryskiwaniu czynność mieszania powtarzać każdorazowo przed przystąpieniem do dalszej pracy.

POSTĘPOWANIE Z RESZTKAMI CIECZY UŻYTKOWEJ I MYCIE APARATURY

Z resztkami cieczy użytkowej po zabiegu należy postępować w sposób ograniczający ryzyko skażenia wód powierzchniowych i podziemnych w rozumieniu przepisów Prawa wodnego oraz skażenia gruntu, tj.:

- po uprzednim rozcieńczeniu zużyć na powierzchni, na której przeprowadzono zabieg, jeżeli jest to możliwe lub
- unieszkodliwić z wykorzystaniem rozwiązań technicznych zapewniających biologiczną degradację substancji czynnych środków ochrony roślin, lub
- unieszkodliwić w inny sposób, zgodny z przepisami o odpadach.

Po pracy aparaturę dokładnie wymyć.

WARUNKI BEZPIECZNEGO STOSOWANIA ŚRODKA

Przed zastosowaniem środka należy poinformować o tym fakcie wszystkie zainteresowane strony, które mogą być narażone na znoszenie cieczy użytkowej i które zwróciły się o taką informację.

Środki ostrożności dla osób stosujących środek:

Nie jeść, nie pić ani nie palić podczas używania produktu.

Środki ostrożności związane z ochroną środowiska naturalnego:

Nie zanieczyszczać wód środkiem ochrony roślin lub jego opakowaniem.

Nie myć aparatury w pobliżu wód powierzchniowych.

Unikać zanieczyszczania wód poprzez rowy odwadniające z gospodarstw i dróg.

W celu ochrony organizmów wodnych konieczne jest określenie strefy ochronnej w poniżej podanej odległości od zbiorników i cieków wodnych dla:

- 3 metrów – ziemniak, pomidor, ogórek,
- 5 metrów – cebula, sałata, kalafior, brokuł, tytoń, rośliny ozdobne,
- 10 metrów – winorośl.

Okres od zastosowania środka do dnia, w którym na obszar, na którym zastosowano środek mogą wejść ludzie oraz zostać wprowadzone zwierzęta (okres prewencji):

nie wchodzić do czasu całkowitego wyschnięcia cieczy użytkowej na powierzchni roślin.

Okres od ostatniego zastosowania środka do dnia zbioru rośliny uprawnej (okres karencji):

- | | |
|------------------------------------|----------------|
| - ogórek | - 3 dni, |
| - pomidor, ziemniak | - 7 dni, |
| - cebula, brokuł, kalafior, sałata | - 28 dni, |
| - winorośl | - 56 dni, |
| - tytoń | - nie dotyczy. |

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny przeznaczone na paszę do dnia w którym zwierzęta mogą być karmione tymi roślinami (okres karencji dla pasz): nie dotyczy.

Okres od ostatniego zastosowania środka na rośliny do dnia w którym można siać lub sadzić rośliny uprawiane następczo: nie dotyczy.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA I BEZPIECZNEGO USUWANIA ŚRODKA OCHRONY ROŚLIN I OPAKOWANIA

Chronić przed dziećmi.

Środek ochrony roślin przechowywać:

- w miejscach lub obiektach, w których zastosowano odpowiednie rozwiązania zabezpieczające przed skażeniem środowiska oraz dostępem osób trzecich,
- w oryginalnych opakowaniach, w sposób uniemożliwiający kontakt z żywnością, napojami lub paszą,
- w temperaturze 0 °C - 30°C, z dala od źródeł ciepła.

Zabrania się wykorzystywania opróżnionych opakowań po środkach ochrony roślin do innych celów.

Niewykorzystany środek przekazać do podmiotu uprawnionego do odbierania odpadów niebezpiecznych.

Opróżnione opakowania po środku zwrócić do sprzedawcy środków ochrony roślin będących środkami niebezpiecznymi.

PIERWSZA POMOC

Antidotum: brak, stosować leczenie objawowe.

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać opakowanie lub etykietę.

Okres ważności - 3 lata

Data produkcji -

Zawartość netto -

Nr partii -